

Gastricumeel®

Comprimidos Sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N° H-950

Hecho en Alemania

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Argentum nitricum D6 30 mg; Acidum arsenicosum D6 30 mg; Pulsatilla pratensis D4 60 mg; Strychnos nux-vomica D4 60 mg; Carbo vegetabilis D6 60 mg; Stibium sulphuratum nigrum D6 60 mg. Como excipientes: estearato de magnesio y lactosa. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Venta directa en establecimientos tipo A y B

Indicaciones: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de gastritis aguda y crónica, pirosis, meteorismo.

Advertencias: No use dosis mayores ni por más tiempo del recomendado. Si los síntomas se mantienen o intensifican después de 3 días de tratamiento, consulte al médico. Durante el embarazo o la lactancia, este medicamento se debe administrar sólo bajo supervisión médica. Puede aparecer un agravamiento inicial de los síntomas, si esto ocurre se deberá suspender el tratamiento y consultar al médico.

Contraindicaciones: No administrar en caso de antecedentes de alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.

Modo de empleo: Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.

Dosis pediátricas:

6 -11 años 1 comprimido 2 veces al día

2 - 5 años 1 comprimido 1 a 2 veces al día

< 2 años 1 comprimido al día

-Heel



Dosis aguda o inicial:

Adultos y niños mayores de 12 años

1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Dosis Pediátrica Aguda:

6 -11 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

2 - 5 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 6 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

< 2 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 4 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Interacciones con otros medicamentos: Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlos simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte con el médico o químico farmacéutico.

Efectos secundarios: No se han descrito en la bibliografía. En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Precaución: Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes diabéticos.

Vía de administración: Sublingual.

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Condiciones de almacenamiento: Proteger del calor, de la luz solar directa y de la humedad. Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso. Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 30 °C. No use después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Bibliografía: German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978. Vannier; Poirier J.; Precis de Matière Médicale Homeopathique; Ed. Boiron, 1985. Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2° Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

® = Marca Registrada

Medicamento Homeopático

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos N° 260, piso 6

Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

