

Spascupreel®

comprimidos sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N°: H-931

Hecho en Alemania

Composición: Cada comprimido contiene: Citrullus colocynthis D4 30 mg; Ammonium bromatum D4 30 mg; Atropinum sulfuricum D6 30 mg; Veratrum album D6 30 mg; Magnesium phosphoricum D6 30 mg; Gelsemium sempervirens D6 30 mg; Passiflora incarnata D2 15 mg; Amanita muscaria D4 15 mg; Chamomilla recutita D3 15 mg; Cuprum sulfuricum D6 15 mg; Aconitum napellus D6 60 mg. Como excipientes: estearato de magnesio y lactosa. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Venta directa

Indicaciones: Medicamento homeopático antiespasmódico.

Usos: Espasmos del estómago, intestino, vesícula biliar, dolores menstruales.

Advertencias: En embarazo o lactancia, este medicamento se debe administrar sólo bajo supervisión médica. Si los síntomas son muy agudos o se acompañan de vómitos, fiebre, ictericia (coloración amarilla de la piel y parte blanca del ojo) y estos no ceden luego de la administración de las primeras dosis de este medicamento, deberá consultar al médico. Si los síntomas son leves a moderados y se mantienen o empeoran luego de 3 días de tratamiento, consulte al médico. No use dosis mayores ni por más tiempo del recomendado.

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia al medicamento o a alguno de sus componentes, especialmente a Chamomilla o a alguna otra planta de la familia de las Compuestas (Asteráceas).

No administrar en caso de trastornos atónicos del vaciado vesical, como por ej. adenoma prostático, ni a pacientes con glaucoma.

Modo de empleo:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.

Dosis pediátricas:

6-11 años: 1 comprimido 2 veces al día.

2-5 años: 1 comprimido 1 a 2 veces al día.

< 2 años: 1 comprimido al día.

Dosis aguda o inicial: Adultos y niños mayores de 12 años 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Dosis Pediátrica Aguda:

6-11 años: 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

2-5 años: 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 6 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

< 2 años: 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 4 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

En niños menores de 6 años, se deben disolver los comprimidos en un poco de agua antes de administrarse.

Vía de administración: Por vía sublingual.

Interacciones con otros medicamentos: Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte con el médico o químico farmacéutico.

Efectos secundarios: Puede producir midriasis y sequedad de la boca, si esto ocurre se deberá consultar al médico. En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Precaución: Este medicamento contiene lactosa.

Condiciones de almacenamiento: Mantener el frasco bien cerrado, en su envase original, a no más de 30°C. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener fuera del alcance de los niños.

Bibliografía: German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978. Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2º Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

® = Marca Registrada

Medicamento Homeopático

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos N° 260, piso 6, Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl