



Lymphomyosot®



Comprimidos sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Medicamento homeopático

Hecho en Alemania

Vía de Administración: Sublingual

Reg. I.S.P. N°: H-1288

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Araneus diadematus D6 15,0 mg; Calcium phosphoricum D12 15,0 mg; Equisetum hiemale D4 15,0 mg; Ferrum iodatum D12 30,0 mg; Fumaria officinalis D4 15,0 mg; Gentiana lutea D5 15,0 mg; Geranium robertianum D4 30,0 mg; Juglans regia D3 15,0 mg; Levothyroxinum D12 15,0 mg; Myosotis arvensis D3 15,0 mg; Nasturtium officinale D4 30,0 mg; Natrium sulfuricum D4 15,0 mg; Pinus sylvestris D4 15,0 mg; Scrophularia nodosa D3 15,0 mg; Smilax D6 15,0 mg; Teucrium scorodonia D3 15,0 mg; Veronica officinalis D3 15,0 mg. Como excipientes: estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Medicamento homeopático regulador linfático

Indicación: Medicamento homeopático usado como coadyuvante en el tratamiento de apoyo al sistema linfático en infecciones asociadas con ganglios linfáticos agrandados y como terapia de apoyo para la retención leve de líquidos acompañada de hinchazón de las extremidades.

Usos: Apoyo en la regulación linfática de las extremidades. Ayuda al alivio de la hinchazón de brazos y piernas provocado por la retención de líquidos. Apoyo al organismo a través del drenaje linfático. Ayuda a reducir el edema linfático optimizando la reparación de las heridas. Apoya la recuperación de la inflamación/ infección por ejemplo: Amigdalitis crónica, hipertrofia benigna de ganglios linfáticos e hipertrofia adenoamigdalina.

Advertencias: No use dosis mayores a las recomendadas. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte al médico.

Uso durante el embarazo y la lactancia: No existen antecedentes de que las diluciones homeopáticas de los compuestos presentes en este medicamento sean tóxicas durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo, al igual que con todos los medicamentos, consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.



-Heel





Efectos secundarios: Al igual que todos los medicamentos, este medicamento homeopático puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Interacciones con otros medicamentos: Si bien no se han descrito, el efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Modo de empleo:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar

Adultos y mayores de 12 años: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido, 3 veces al día.

Niños de 6 a 11 años: 1 comprimido 2 veces al día.

Niños de 2 a 5 años: 1 comprimido 1 a 2 veces al día.

Menores de 2 años: 1 comprimido 1 vez al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y mayores de 12 años: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido cada ½ o 1 hora, hasta 12 veces al día y luego continuar con las dosis estándar.

Niños de 6 a 11 años: 1 comprimido cada 1 o 2 horas hasta 8 veces al día y luego continuar con la dosis estándar.

Niños de 2 a 5 años: 1 comprimido cada 1 o 2 horas hasta 6 veces al día y luego continuar con la dosis estándar.

Menores de 2 años: 1 comprimido cada 1 o 2 horas hasta 4 veces al día y luego continuar con la dosis estándar.

Método de administración: Preferentemente, permita que la tableta se disuelva bajo la lengua y luego tráguela. Para los niños, es posible triturar la tableta y agregar una pequeña cantidad de agua. Este medicamento debe administrarse alejado de las comidas.

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

VENTA DIRECTA

Condiciones de Almacenamiento: Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 30 °C. Cerrar el frasco de comprimidos inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener lejos del alcance de los niños.

® = Marca Registrada

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos N° 260, piso 6

Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

