



Coenzyme compositum

comprimidos sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Medicamento homeopático

Hecho en Alemania

Vía de Administración: Sublingual

Reg. I.S.P. N°: H-1293

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Acidum cis-aconicum D8 1,0 mg; Acidum ascorbicum D6 1,0 mg; Acidum citricum D8 1,0 mg; Acidum fumaricum D8 1,0 mg; Acidum alpha-ketoglutaricum D8 1,0 mg; Acidum DL malicum D8 1,0 mg; Acidum succinicum D8 1,0 mg; Dinatrium-Adenosinum triphosphoricum D10 1,0 mg; Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva e radice rec. D6 1,0 mg; Coenzym A D8 1,0 mg, Cysteinum D6 1,0 mg, Nadidum D8 1,0 mg; Natrium pyruvicum D8 1,0 mg; Natrium riboflavinum phosphoricum D6 1,0 mg; Nicotinamidum D6 1,0 mg; Pulsatilla pratensis D6 1,0 mg; Pyridoxinum hydrochloricum D6 1,0 mg; Sulfur D10 1,0 mg; Thiaminum hydrochloricum D6 1,0 mg; Acidum thiocticum D6 1,0 mg; Barium oxalsuccinicum D10 1,0 mg; Cerium oxalicum D8 1,0 mg; Hepar sulfuris D10 1,0 mg; Magnesium oroticum dihydricum D6 1,0 mg; Manganum phosphoricum D6 1,0 mg; Natrium diethylxalaceticum D6 1,0 mg. Excipientes: Lactosa monohidrato, Estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Clasificación: Medicamento homeopático regulador de procesos enzimáticos.

Indicación: Medicamento homeopático usado para la estimulación de sistemas enzimáticos respiratorios intracelulares bloqueados en enfermedades degenerativas.

Advertencias: No use dosis mayores a las recomendadas. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte al médico.

Precauciones: Este producto contiene lactosa. Si usted tiene intolerancia a la lactosa, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Uso durante el embarazo y la lactancia: No existen antecedentes de que las diluciones homeopáticas de los compuestos presentes en este medicamento sean tóxicas durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo, al igual que con todos los medicamentos, consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

-Heel





Efectos secundarios: Al igual que todos los medicamentos, este medicamento homeopático puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Interacciones con otros medicamentos: Si bien no se han descrito, el efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Modo de empleo:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar

Adultos y mayores de 12 años: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido, 3 veces al día.

Niños de 6 a 11 años: 1 comprimido 2 veces al día.

Niños de 2 a 5 años: 1 comprimido 1 a 2 veces al día.

Menores de 2 años: 1 comprimido 1 vez al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y mayores de 12 años: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido cada ½ o 1 hora, hasta 12 veces al día y luego continuar con las dosis estándar.

Niños de 6 a 11 años: 1 comprimido cada 1 o 2 horas hasta 8 veces al día y luego continuar con la dosis estándar.

Niños de 2 a 5 años: 1 comprimido cada 1 o 2 horas hasta 6 veces al día y luego continuar con la dosis estándar.

Menores de 2 años: 1 comprimido cada 1 o 2 horas hasta 4 veces al día y luego continuar con la dosis estándar.

Método de administración: Preferentemente, permita que la tableta se disuelva bajo la lengua y luego tráguela. Para los niños, es posible triturar la tableta y agregar una pequeña cantidad de agua. Este medicamento debe administrarse alejado de las comidas.

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Venta directa

Condiciones de Almacenamiento: Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 30 °C. Cerrar el frasco de comprimidos inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener lejos del alcance de los niños.

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos N° 260, piso 6

Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

